





**DÉPISTAGE
DES INFECTIONS SEXUELLEMENT
TRANSMISSIBLES**

SIPE 
www.sipe-vs.ch



Les infections sexuellement transmissibles (IST) peuvent être contractées lors de contacts intimes non protégés: pénétrations, sexe oral, partage de sextoys, caresses...

Dans une majeure partie des cas, les IST sont asymptomatiques. Il est donc possible d'être infecté·e sans s'en rendre compte. Pour le savoir, il est nécessaire de se faire dépister. En cas de résultat réactif, il convient de se faire traiter.




Dans les Centres SIPE, des professionnel-le-s réalisent des dépistages d'infections sexuellement transmissibles (IST) à moindres coûts. La confidentialité et l'anonymat sont garantis.

Un-e professionnel-le définira avec vous les dépistages nécessaires dans votre situation. Si les résultats confirment la présence d'une ou plusieurs IST, vous serez accompagné-e pour débiter un suivi et un traitement médical adéquat.

Suivez les règles du safer sex pour limiter les risques...

1. Pénétration vaginale ou anale avec préservatif.
2. Et parce que chacun·e l'aime à sa façon : faites sans tarder votre safer sex check sur www.lovelife.ch.



Réaliser régulièrement des dépistages et se faire traiter si cela est nécessaire permet de préserver votre santé et d'éviter de rencontrer des difficultés liées à la fertilité. Cela permet également de rompre la chaîne de transmission des IST.

Si vous le souhaitez, vous pourrez discuter des vaccins recommandés et des stratégies adaptées à vos pratiques afin de réduire vos risques de contracter des IST.

VIH

À partir de 6 semaines après un rapport à risque, le résultat du dépistage est fiable.

Le dépistage nécessite de prélever du sang en piquant le bout du doigt.

Le résultat est communiqué à la fin de la consultation.

Prix: 20.- *

CHLAMYDIA ET GONORRHÉE

À partir de 2 semaines après un rapport à risque, le résultat du dépistage est fiable.

Grâce à des explications préalables, vous réaliserez les frottis nécessaires pour le dépistage.

Les résultats sont communiqués la semaine suivante.

Prix: 50.- *

SYPHILIS

À partir de 3 mois après un rapport à risque, le résultat du dépistage est fiable.

Le dépistage nécessite de prélever du sang en piquant le bout du doigt.

Le résultat est communiqué à la fin de la consultation.

Prix: 20.- *

HÉPATITE C

À partir de 6 mois après un rapport à risque, le résultat du dépistage est fiable.

Le dépistage nécessite une prise de sang.


Le résultat est communiqué la semaine suivante.

Prix: 20.- *

Un forfait de base de 20.- est demandé pour la réalisation d'un ou plusieurs dépistages.

Les personnes de moins de 18 ans paient la moitié des prix indiqués.

Pour plus d'informations:



Brig
027 923 93 13

Monthey
024 471 00 13

Sion
027 323 46 48

Martigny
027 722 66 80

SIPE
www.sipe-vs.ch

Sierre
027 455 58 18

